



تسكين آلام الولادة والمخاض

التخدير فوق الجافية (الابيديورال) هو التقنية الأكثر أمانا وفعالية للتحكم بالآلام المخاض والولادة، ويمارس من قبل أخصائي التخدير من أصحاب الخبرة بهذا الإجراء.

هذه التقنية فعالة خلال دقائق قليلة بحيث يختفي الألم تماماً وبنفس الوقت لا تأثر على الأحساس الأخرى كالاحساس بانقباضات الرحم بحيث تستطيع الأم أن تدفع الجنين في الوقت المناسب وذلك يساعد على أن تتم الولادة بطريقة طبيعية.

تساعد هذه التقنية أيضاً بالحركة واختيار وضعيات أخرى غير تقليدية تتناسب مع الولادة مثل وضعية القرفصاء كما أنها تسمح للألم المرضعه بحرية الحركة والمشي وتستطيع الأم المباشرة بالرضاشه في أي وقت تشاء.

التخدير فوق الجافية (الابيديورال) يتتناسب تماماً مع أغراض منح وحفظ الخلايا الجذعية.

يقوم المستشفى بتوفير خدمة التخدير فوق الجافية (الابيديورال) بطريقة تضمن توفر طبيب التخدير بشكل تام وخاص لغرفة الولادة وبشكل يضمن تقديم هذه الخدمة على مدار الساعة وخلال 30 دقيقة من طلب الخدمة.

التخدير فوق الجافية (الابيديورال) هي خدمة مجانية.

ان تقنيات واجراءات التخدير والتسكين الدوائي و **التخدير فوق الجافية (الابيديورال)** المتبعة تتبع التوصيات والمبادئ الموصى بها من قبل (مجمع أطباء تخدير الولادة العالمي ؛ الاتحاد الأوروبي لأطباء التخدير ؛ الاتحاد الأمريكي لأطباء التخدير)

في هذا المستشفى هناك نسبة 52% من الولادات تحصل على خدمة التخدير فوق الجافية (الابيديورال) والخدمة متوفرة بأي ساعه في اليوم و مجانية بالكامل.

يمكن طلب هذه الخدمة في أي وقت خلال المخاض والولادة وليس له علاقة بمدى توسيع عنق الرحم بالاتفاق مع طاقم التوليد.

لا تستخدم هذه التقنية من أجل حالات تسكين آلام المخاض والولادة الطبيعية فقط ولكن يمكن أيضاً أن تستخدم في حالات خاصة مثل المخاض والولادة المبكرة والمخاض الطويل والولادة المحفزة (الطلق الاصطناعي) و حالات المخاض التجاري بعد العمليات القيصرية السابقة.

التخدير فوق الجافية (الابيديورال) يقترح أيضاً ويفيد في تقليل الاجهاد وألم المصاببة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري وأمراض الاعطال العضلي المزمن.

خلال المخاض من الممكن أن يقرر طبيب النساء والتوليد اجراء عملية قيصرية وفي حال استخدام هذه التقنية يمكن لطبيب التخدير تحويلها الى تخدير مناسب لإجراء العملية وذلك من خلال حقن أدوية في

القسطرة الموجودة والتي تسمح خلال دقائق قليلة بتخدير الجزء السفلي من الجسم والغاء الاحساس بشكل يمكن من اجراء العملية الجراحية بشكل آمن.

يمكن في هذا المستشفى اجراء التخدير فوق الجافية (الايبيدورال) بالتزامن مع استخدام التخدير النصفي (السبانيال) بحيث يجمع بهذه الطريقة بين قوة التخدير النصفي ومرنة تخدير فوق الجافية بالتحكم في مدة التخدير بالشكل الذي يسمح بالتعافي السريع من الألم و التحكم الأمثل في الألم.

الأدوية المستخدمة في هذا النوع من التخدير لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية.

يمكن أيضا للنساء الحوامل والذين لم يتم الاتفاق المسبق خلال فترة الحمل بعمل هذا الاجراء يمكن لهم طلب هذا النوع من التخدير خلال المخاض والولادة أو اجراء عملية قيصرية اذا لزم الأمر؛ لهذا السبب نحن ندعوا كل السيدات الحوامل واللاتي ينوبن الولادة في هذا المستشفى ان يخضعن لمعاينة طبيب التخدير بعد مرور الأسبوع 34 من الحمل؛ هذه المعاينة لا تتطلب اجراء تحاليل طبية خاصة و يكتفى بالتحاليل المطلوبة من طبيب النساء خلال فترة الحمل؛ و لجز موعد المعاينة مع طبيب التخدير يجب الاتصال بمركز الحجوزات بالمستشفى (**Il Centro Prenotazioni – Call Center Regionale**) ولا يلزم الحصول على تحويل خاص من طبيب العائلة أو طبيب النساء لعمل حجز للموعد.

هذا المستشفى مجهز بوحدة عناية حثيثة للأطفال حديثي الولادة و الأمل.

أطباء التخدير يشاركون بشكل مستمر ومنظم بدورات معتمدة من وزارة الصحة للتطوير في اجراء هذه الخدمة.

10 نقاط لامتيازية الولادة بدون ألم:

مؤشرات الجودة التنظيمية

1. تسكين فوق الجافية متوفّر على مدار الساعة و مجاني.
2. تواجد الأطباء المناوبين لتقديم الخدمة على مدار الساعة.
3. توفر واستعمال روتيني موثق للمعلومات والتحضير للولادة، معاينة طبيب التخدير والموافقة المعلوماتية قبل الولادة.
4. وجود مراقبة الجودة بعد الولادة خارج المستشفى.
5. توثيق أنشطة تدريسية وبحث في هذه المجال.

مؤشرات الجودة التقنية

6. اعطاء التقنية ضمن 30 دقيقة من الطلب.
7. اعطاء التقنية مهما كان التوسيع.
8. اعطاؤها من غير انقطاع ل كامل مدة الولادة.
9. وجود بروتوكولات مكتوبة مصدقة تضمن التجانس و معايير التسكين.
10. وجود وثائق تثبت حدوث المضاعفات.



هل تكون هناك حالات تمنع التخدير الموضعي؟

يفضل الامتناع عن هذا النوع من التخدير في بعض الحالات المرضية للألم مثل: اضطرابات النزيف والتخثر، الأمراض المعدية والأمراض العصبية. المعاينة قبل الاجراء من قبل أخصائي التخدير ستacji الضوء على أي مشكلة شخصية ممكن ان تؤثر على هذا الاجراء.

هل يمكن حدوث آثار جانبية ومضاعفات؟

في عدد قليل من الحالات يمكن تواجد آثار جانبية متواضعة وقصيرة المدى تشمل: انخفاض ضغط الدم، قشعريرة، حكة جلدية وصعوبة بالتنفس.

في حالات نادرة فقط إذا كان هناك مشكلة تقنية (حقن الجافية غير المقصود)، يمكن أن يحدث بعد الولادة صداع قد يدوم لبعض الأيام. هذا النوع من الصداع بالعادة يكون حميد، عابر وقابل للعلاج ولكن يمكن أن يؤثر على الحياة الطبيعية للألم. بالعادة يشفى منه عفويًا من خلال الراحة بالفرش. طبيب التخدير سيفترح لكل حالة العلاج الأكثر فعالية وسرعة.

هذه المضاعفات لا تأثر على الرضاعة الطبيعية ولا يكون لها آثار جانبية على المولود الجديد.

الأبحاث وثقت حدوث حالة وحدة من كل 200 ألف حالة من مضاعفات خطيرة للامهات.

لا يوجد توثيق لأي حالة مضاعفات بالطفل مرتبطة بهذه التقنية