

## RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO

### Preparazione

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame a digiuno da almeno 6 ore, **solamente** in caso di RM dell'addome superiore **deve** portare il risultato recente del dosaggio della CREATININEMIA e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame).

- È consentito assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio Medico Curante con acqua.
- Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini.
- Si raccomanda di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso. in caso di Pacemaker o dispositivi cardiaci impiantabili rm compatibili contattare la Struttura di radiologia per concordare l'appuntamento con l'elettrofisiologia per il settaggio pre e post RM del dispositivo per concordare l'appuntamento con l'elettrofisiologia per il settaggio pre e post RM del dispositivo

### Controindicazioni

In presenza di una delle seguenti controindicazioni o in caso di dubbi contattare direttamente la SC di Radiologia al 0382/503051 o 0382/503055

- Presenza di elementi all'interno del corpo: pace maker, (anche RM compatibili), loop recorder, neurostimolatore, pompa ad infusione, schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione professionale a metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, spalla, gomito, apparato urogenitale...), apparecchi ortodontici fissi, protesi acustiche interne fisse, impianti cocleari, protesi ossiculari, cristallino artificiale, clips metalliche inserite in seguito ad interventi chirurgici (es.interventi in videolaparoscopia, interventi su cuore, addome,....)
- Stato di gravidanza/allattamento
- Presenza di allergie

In caso di **allergie note o pregresse al mezzo di contrasto, gravi allergie a farmaci o sostanze**, in presenza di **insufficienza renale cronica**, il Medico Curante dovrebbe considerare prioritariamente indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di contrasto; se invece è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare presso la SC Radiologia alcune note specifiche da presentare al curante



### Note

È sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare  $<30\text{ml/min}$   
Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive ad una indagine radiologica dell'addome e nei 7 giorni successivi ad un'altra indagine con analogo mezzo di contrasto.